

112 年擴大推動 65 歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫

Q&A

➤ 實施期間

Q1：有關 112 年擴大 65 歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫實施期間為何？

A：本計畫係分 3 階段實施，各階段實施對象如下：

1. **第一階段 (112.10.2 起)**：曾接種過 PCV13/15 且間隔至少 1 年者（高風險對象間隔至少 8 週），可公費接種 1 劑 PPV23。
2. **第二階段 (112.11.27 起)**：從未曾接種過 PCV13/15 及 PPV23 者，可公費接種 1 劑 PCV13；間隔至少 1 年後（高風險對象間隔至少 8 週）再公費接種 1 劑 PPV23。
3. **第三階段 (112.12.25 起)**：曾經接種 PPV23 且間隔至少 1 年者，可公費接種 1 劑 PCV13。

➤ 實施對象

Q2：有關 112 年擴大民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫實施對象為何？

A：具中華民國國民身分之 65 歲以上【以 112 年為例，實施對象為 47 年次（含）以前出生】者，即以「接種年」減「出生年」計算大於等於 65 歲者；如為外籍人士，需具健保身分或持有有效居留證。

➤ 接種實務

Q3：有關 112 年擴大 65 歲以上民眾公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫接

種原則為何？

A：

- 1.曾接種過 PCV13/15 且間隔至少 1 年者可接種 1 劑 PPV23（高風險對象間隔至少 8 週）。
- 2.從未曾接種過 PCV13/15 及 PPV23 者可接種 1 劑 PCV13 間隔至少 1 年可再接種 1 劑 PPV23（高風險對象間隔至少 8 週）。
- 3.曾經接種 PPV23 且間隔至少 1 年者可接種 1 劑 PCV13。
- 4.曾接種 PCV13/15 及 PPV23 者就已完成接種達保護效益，無需再接種 PCV13 及 PPV23 疫苗。

Q4：如高風險對象已接種 PPV23 接續的 PCV13 間隔也是至少 8 週嗎？

A：否，如高風險對象已接種 PPV23 須間隔至少 1 年才能接種 PCV13。

Q5：有關 112 年擴大 65 歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫之高風

險對象為何？

A：本計畫之高風險對象須為 65 歲以上【以 112 年為例，實施對象為 47 年次（含）以前出生】，且由醫師評估認定為以下對象：

- 1.脾臟功能缺損。
- 2.先天或後天免疫功能不全。
- 3.人工耳植入。
- 4.腦脊髓液滲漏。
- 5.正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。

Q6：如不確定自己是否為高風險對象怎麼辦？

A：可至原就醫或長期追蹤之醫療院所，由醫師藉由病歷資料及專業評估是否符合高風險對象。

Q7：如不記得以前有無接種過肺炎鏈球菌疫苗，可否公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：可確認健保卡有無 PPV23 註記貼紙，或至衛生所或合約醫療院所，請其協助查詢接種紀錄，若無接種紀錄，則依接種原則提供 1 劑 PCV13 及 1 劑 PPV23 接種。

Q8：如已接種疫苗但未有接種紀錄，且欲循建議原則接種者，應如何接續接種公費疫苗？

A：建議先至原接種之醫療院所或衛生所進行補登，再依循接種建議接種，如已無法取得接種證明，經醫師評估可提供 1 劑 PCV13，再間隔至少 1 年，再提供 1 劑 PPV23。

Q9：如已接種 PCV13/15，查無接種紀錄，能否得提供 PPV23 接種？

A：針對曾接種 PCV13/15，經查找仍無法取得接種紀錄之特例情形，為避免影響接種單位疫苗作業執行，對於堅持接種 PPV23 之民眾，得請其簽具聲明切結，陳述所言屬實且瞭解 PPV23 及 PCV13/15 接種順序對免疫保護效果之影響，於接種 PCV13/15 後間隔至少 1 年，得提供 PPV23 接種。

Q10：如已接種 PCV13/15，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：依接種原則，已接種 PCV13/15 者，建議間隔至少 1 年可接種 1 劑

PPV23，就已完成接種。惟若已自費接種 PCV13/15 者，民眾仍有公費接種 PCV13 需求，間隔至少 1 年，經醫師評估可公費提供 1 劑 PCV13。

Q11：如已接種 PCV13/15 及 PPV23，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：依接種原則，已接種 PCV13/15 及 PPV23 者，就已完成接種達保護效益，無需再接種 PCV13 及 PPV23。惟若已自費完成接種 PCV13/15 及 PPV23 者，民眾仍有公費接種 PCV13 需求，間隔至少 1 年，經醫師評估可公費提供 1 劑 PCV13。

Q12：PCV13 及 PPV23 可與其他疫苗同時接種嗎？

A：

1.PCV13/15 與 PPV23 接種須間隔至少 1 年（先接種 PCV13/15 之高風險對象間隔至少 8 週可接種 PPV23），但是和其他疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。

2.另秋冬同時提供肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及 COVID-19 疫苗，該三種疫苗可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種三種疫苗，同手臂接種兩種疫苗建議距離至少 2.5 公分。

Q13：若 PCV13 及 PPV23 接種間隔不足是否需要補種？

A：請確實依接種間隔接種，若發生接種間隔不足，如 PCV13/15 與 PPV23 間隔不足 1 年、PPV23 與 PCV13/15 間隔不足 1 年或高風

險對象 PCV13/15 與 PPV23 間隔不足 8 週等情形，不需補種。