

何謂伊波拉病毒



- ◆ 伊波拉病毒感染是人及靈長類(猴子、大猩猩及黑猩猩)的一種嚴重致命疾病。
- ◆ 伊波拉病毒感染須於24小時內通報衛生主管機關。

打噴嚏會不會傳染伊波拉病毒



會

，有症狀的感染者分泌物有病毒顆粒

傳染途徑

動物→人

接觸遭感染的
果蝠、猿、猴

人→人

直接接觸到被感
染者或其屍體的
血液、分泌物、
器官或精液

間接接觸遭感染
者體液汙染的環
境(如：衣服、針頭)



得到伊波拉病毒的症狀

潛伏期

- 2~21天，此時還不會傳染
- 出現症狀後才有傳染力

初期症狀

- 突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛與咽喉痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。

末期症狀

- 常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。

末期症狀



嘔吐

腹瀉

咳嗽

出血

初期症狀




發燒

噁心

頭痛

疲倦

伊波拉病毒全球散佈圖



統計至103年10月10日止



去疫區如何防範伊波拉病毒

遠離感染來源，以降低旅遊受感染的可能性：

- 避免接觸或食用**野生動物**。
- 避免直接接觸人或動物的**屍體**。
- 避免與**感染者**或曾暴露於疫區不適者，有密切直接或間接接觸。



我可能得了伊波拉病毒感染怎麼辦



自伊波拉病毒流行區返臺旅客，**於入境前若有身體不適，請主動告知機場（港口）檢疫站**，檢疫人員將協助後送就醫。

自伊波拉病毒流行區返台旅客，返國後21天內，如有身體不適，**請立即撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)**；應戴上口罩、**避免接觸他人**，儘速就醫，主動告訴醫護人員之前曾到伊波拉病毒感染病例發生地區。



嘉義市防範伊波拉病毒

任何疾病問題皆可問

防疫專線1922



(含超連結)

- 本市應變醫院(衛生福利部嘉義醫院)及隔離醫院(嘉基、中榮嘉義分院、聖馬)皆完成伊波拉病毒感染管治措施、收治動線、負壓隔離病房運作及維護、防疫物資整備情形。
- 本市全數醫院皆完成伊波拉病毒教育訓練。
- 衛生局及各醫院之防疫物資均高於安全儲備量。
- 持續追蹤入境旅客發燒監測。